



DEO OPTIMO MAX.

UNI ET TRINO,

VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ;
Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICA*,

QUOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBUS
*manè discutienda in Scholis Medicorum, die Jovis quartâ mensis
Decembris, anno Domini M. DCC. LXXXIII.*

M^o. PETRO-JOANNE-CLAUDIO MAUDUYT DE LA
VARENNE, Doctore Medico, Præsidente.

An Dysentericis Anodyna?

I.

MEDICAMENTA in variis distincta generibus, prout diversimodè operantur, varia sortita sunt nomina. Quædam cum impetu

* Authore M. HUNAUER, anno 1739.

foris è corpore sursum deorsumve noxium humorem pellunt; ideò Emerica vel purgantia audiunt. Alia lenitè emolliendo alvum, quasi diluendo tacitè subducunt. Quædam lotium concitant, vel sudore diffuso, quod morbosum est amandant, & sic massam sanguineam depurant. Unum est quod vasa sanguinem continentia deplendo, sicut alia præcedit in curatione morborum medicamenta, ità & his antecedit. Intèr omnia medicamenta, videntur Anodina veluti manus Deorum quæ corpori ægro impositæ ipsum jucundè absque molestiâ levant; si quidè horum natura & virtus dolores, tormina, cruciatus lenire, imò prorsus tollere.

I I.

FI B R A nervosa cùm ità extenditur, ut dissolutionem minitetur, fit doloris sensus eò acrior, quò fibra ruptioni propior. Doloris causa id omne quod talem exensionem excitat. Obstructio, inordinatus spirituum animalium motus, humor acris & rodens, &c..... Sensus is animæ molestissimus functiones lædit, omnium ferè morborum comes, inflammationes concomitans, & quem velut affectæ subsequuntur jactatio, irrequies, vigiliæ, sæpè febris, quandòque etiàm convulsio, gangræna, crucem ægro figit ac Medico. Tollendis ideò doloribus satagit Medicus sublata causâ quantum fieri potest Erethismum solvendo laxatis fibris, concretum humorem resolvendo, motum & materiem distendentem minuendo, lenitis acribus humoribus & iisdem discussis vel eductis.

I I I.

FR E Q U E N S, cruenta mucosæque alvi dejectio, cùm dolore; cruciatu & torsione intestinorum dysenteria nuncupatur. Morbo incipiente primùm biliosa est alvus, aut saltem mucosam fundit intestinorum pituitam: dein subpingues fiunt dejectiones sanguine etiàm plùs vel minùs permixtæ: post hæc strigmenta & veluti interiores tunicæ intestinorum prodeunt excrementis cruentis ac purulentis diversimodè coloratis mixtæ. Sæpiùs videntur febris acuta, abdominis tensio, intest-

tinorum ac mesenterii inflammatio. Hujus morbi sedes plerumque intestini pars ea quæ Colon vocatur. Omnis Dysenteria gravis ac difficilis. Citò tollit ægrum, vel ex acuto morborum genere dum chronicus fit eum discruciendo paritèr conficit. Utrovis modo partes affectæ gangrænâ tandèm sphaceloque putrescunt. Dùm epidemicè sævit in castra, exercitus etiam integros funditus delet.

I V.

CAUSA Dysenteriam continens & conjuncta humor acris à depravatâ chylosi ortum ducens, per vasa unâ cum sanguine ad glandulas intestinorum delatus, ibique secretus; qui quidèm mucosior factus & acrior, erodendo venarum oscula aperit & vellicando dolores aliaque symptomata causatur. Hæc verò mitiora evadunt anodynis medicaminibus summoperè demulcentibus, & sanationis spem eorum usus ostendit. Ideò victus ex jusculis farinosis, potus leniens edulcorandis acoribus, diluens emolliendis partibus ultrâ tonum tensis, conducunt. Ideò emulsiones, clysmata blandissima, aliaque id genus conferunt. Ideò venæ sectio egregium Anodynum in usum venit, & torminibus cæterisque symptomatis sedandis maximas habet vires. Sanguinis missio copiam humorum arteriosorum & venosorum minuendo, resistantiam vasorum reddit minorem: hinc vasis nimium distentis contractionis exercitium reddit: Et indè secretiones ac excretiones juxtâ naturæ normam promovet. Laudanum in hoc etiam morbo laudatur eo quod dolores obtundit (licèt non sublatâ causâ) Sensorio communi per vim narcoticam obtuso; nam interim nihilominus nonnulli remonentur effectus ex doloris & acrimoniæ sensu oriundi.

V.

IPECACOAHA brasiliensibus, radix dysenterix sanandæ dicata, in quo morbo specificum perhibetur, vomitum ciet, solida irritat, sanguinis motum & per inferiora humorem Dysenterix fomitem educit. Ideò cautio habenda & paregorica præscribuntur. Præterea

ubi febris aut inflammatio, tensio abdominis vel dolor immanis adest; aut etiam quando dejectiones mucosæ siccioris sunt consistentiæ, vel porraceæ, virides, æruginosæ, ægrotantes in summo versantur discrimine; & hæc Symptomata multò vehementiora usu Ipecacoanhæ evadunt, nec remissiora fiunt nisi Anodynis. Verbo dicam in Dysenteria anodyna medicamina tutamina sunt, undè rectè concludēs :

Ergò Dysentericis Anodyna.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. Claudius-Franciscus DU
CHANOY, Rei Obstetriciæ
Professor designatus, è Regiâ
Scientiarum Academiâ Di-
vionensi. | M. Joannes, Matthaus DE
FRASNE. | M. Bartholomæus - Tussanus
LE CLERC, Bibliothecæ Præ-
fectus, Consiliarius Medicus
Regis ordinarius in ejus Cas-
telletto. |
| M. Joann.-Bapt. BAIGNERES. | M. Joannes-Bapt. JUMELIN. | M. Ludovicus-Gab. DUPRÉ,
Serenissimæ Principis Condæ
Consiliarius Medicus. |
| M. Alphonsus-Vincentius-Lu-
dovicus-Antonius LE ROI. | M. Joannes-Carolus DE BRO-
TONNE, | M. Antonius PETIT, in Horro
Regio Anatomæ & Chirur-
giæ Professor, è Regiâ Scien-
tiarum Academiâ, & Mili-
tarium Regni Nosocomiorum
Inspector. |

Proponebat Parisiis MATHÆUS GÉRAUD, Claromontanus apud Avernos;
Doctor Medicus Remensis, nec-non Saluberrimæ Facultatis Medicinæ
Parisiensis Baccalaureus. A. R. S. H. 1783.

AB OCTAVA AD MERIDIEM.



Typis QUILLAV, Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Typographi 1783.